VRUCHTBOOMEN KUNSTMATIG ONDER BESCHERMING VAN MIEREN BUITEN ONZEN ARCHIPEL

DOOR

J. J. M. DE GROOT.

Ruim drie jaren geleden vestigde de heer Vorderman in het tijdschrift *Teysmannia* (deel VI blz. 673) de aandacht op het feit, dat de inlandsche vruchtkweekers te Tjilintjing, oostwaarts van Tandjong Priok, hunne manggatuinen kunstmatig onder de bescherming van mieren stellen, welke zekere snuitkevers, die hunne eieren in het vruchtbeginsel leggen en wier larven dus groote verwoestingen onder de vruchten aanrichten, bemachtigen en verorberen. Om te zorgen dat die mieren niet naar elders verhuizen, worden zij van tijd tot tijd op krengen van leguanen en ander gedierte onthaald, die in de boomen worden opgehangen. Men haalt de nesten uit het bosch en brengt ze met de noodige voorzichtigheid naar de gaarden over, terwijl men een vijandige miersoort zorgvuldig met heet water, vuur en dergelijke middelen verdelgt.

Nu viel onlangs onze aandacht op het feit, dat men hier volstrekt niet met een speciale uitvinding onzer inlanders heeft te doen, wijl iets dergelijks reeds vóór eeuwen in Kwang-tsjioe geschiedde, dat wil zeggen, in het landschap waarvan de stad Canton de hoofdplaats is. In de *Khi leh phiën* 雞肋編, een Chineesch werkje uit de twaalfde eeuw, staat namelijk het volgende te lezen:

„In de bebouwbare gronden van Kwang-tsjioe komt het veel „voor, dat de kleine man uit winstbejag tevens oranjeappelen „en mandarijntjes plant. Hierbij heeft hij last van kleine larven, „die de vruchten beschadigen en opvreten. Zijn er echter vele „mieren op de boomen, dan kunnen die larven niet ontstaan; en „op dezen grond koopen de eigenaars van zulke gaarden mieren „in. Er is dan ook een klasse van lieden ontstaan, die mieren „opzamelen en verkoopen. Zij nemen varkens- of geiteblazen, „doen daar vet in en leggen ze opengespalkt ter zijde van „een mierennest, om wanneer de diertjes er ingekropen zijn, de „blazen weer weg te halen. Men noemt de zaak: het kweken „van oranjeboomieren. 廣州可耕之地小民多種柑橘以圖利。嘗患小蟲損食其實。惟樹多螳則蟲不能生、故園戶之家買螳於人。遂有收螳而販者。用猪羊胞、盛脂其中、張口置蟻穴傍、俟螳入中則持之而去。謂之養柑蟻。