ECHINOIDEA

von H. ENGEL.

Ausser den von Dr. VAN DER HORST sind im Folgenden auch die von Ir. MOOLENGRAAFF bei Curaçao gesammelten Exemplare vermeldet. Sie sind resp. mit H und M bezeichnet.

Eucidaris tribuloides (Lam.).

Caracasbaai: 2 Ex. H, 6 Ex. deren 4 aus grösserer Tiefe M.

Diadema antillarum (Phil.).

Caracasbaai: unter Steinen am Ufer, 1 Ex. H; aus Koralle, 2 Ex. H; Spaansche Haven, 1 Ex. H; aus *Porites furcata*, 1 Ex. H; Caracasbaai, 4 Ex. M; Curaçao, 1 Ex. H, 4 Ex. M.

Arbacia punctulata (Lam.).

Caracasbaai, unter Steinen am Ufer, 1 Ex. H; Spaansch Water, aus *Porites furcata*, 1 Ex. H.

Lytechinus variegatus (Leske).

Caracasbaai, 1 Ex. H; Spaansche Haven, 5 Ex. H, 6 Ex. M.; Spaansch Water: 8 Ex. H, aus *Porites furcata*, viele Ex. H.

Tripneustes esculentus (Leske).

Caracasbaai: 1 Ex. M, unter Steinen am Ufer, 1 Ex. H; Spaansche Haven, 3 Ex. M, 17 Ex. H; Spaansch Water, 1 Ex. H; Boca labadera, 3 Ex. H; Curaçao, viele Ex. M.

Echinometra viridis (A. Ag.).

Caracasbaai: 3 Ex. H, unter Steinen am Ufer, 9 Ex. H, aus Koralle, 2 Ex. H; Spaansche Baai, 2 Ex. H; Spaansch Water: 5 Ex. H, aus *Porites furcata*, 15 Ex. H.

Echinometra lucunter (L.).

Caracasbaai: 2 Ex. H, 4 Ex. M, unter Steinen am Ufer, 8 Ex. H; Spaansche Baai, 3 Ex. H; Spaansche Haven: 8 Ex. M, aus *Porites furcata*, 1 Ex. H; Spaansch Water, aus *Porites furcata*, 3 Ex. H; Boca labadera, 1 Ex. H; Westpunt, 3 Ex. H; Curaçao, viele Ex. M.

Brissus brissus (unicolor) (Leske).

Caracasbaai, viele Ex. M; Spaansche Haven, 12 Ex. M, 1 Ex. H; Curaçao, 7 Ex. M.

Clypeaster rosaceus (L.).

Caracasbaai, Teil einer Schale, M.