BESCHRIJVING
VAN EENE
NIEUWE SOORT VAN GAAI,
GARRULUS LIDTHII.

DOOR

G. F. Westerman.

Met eene afbeelding.

G. affinis Garruli lanceolati, sed major, coloribusque valde diversis. Rostro robusto, compresso, flavescenti. Pedibus robustis, corneis, unguibus flavo-corneis. Cauda rotundata. Remigum quinta reliquis longiorè. Profunde azureus; dorso, scapularibus ventrequè rubiginosis; fronte, loris, gulaque nigris; rhachibus plumarum gulae, apicibus remigum rectricumque lateralium niveis; remigibus secundariis et tectricibus alarum majoribus, fasciis transversis nigris.

Habitat in India Orientali.

Longitudo ab apice rostri ad extremitatem caudae, 13 poll. Paris. Long. alae 7 poll.; apicis alae, 1 poll. Long. caudae, 6 poll. Long. rostri a fronte, 13 lin.; altit. rostri, 7 lin.; latit. rostri $5\frac{1}{2}$ lin. Long. tarsi, 1 poll. 8 lin. Long. dig. medii 1 poll. 2 lin.; unguis hujus digiti, $5\frac{2}{3}$ lin. Long. pollicis, 7 lin.; unguis pollicis, 7 linearum.

Vederen van den kop als gewoonlijk verlengd en eene kleine kuif vormende. Snavel krachtig, sterk te zamen gedrukt, geelachtig. Rug des bovensnavels aanmerkelijk gebogen, aan de zijden naar voren met drie flauwe rondachtige uitsnijdingen. Pooten en nagels krachtig, bruinachtig, op de randen der zolen en op de nagels in het geelachtige trekkende. Vleugels, het eerste derde van den staart bedekkende, afgerond; de vijfde slagpen langer dan de overigen. Staart tamelijk lang, afgerond. Vederen van het voorhoofd, de teugels en den wortel der onderkaak, zeer digt staande, fluweelachtig.

Kleurverdeeling der vederen. Neusvederen, voorhoofd, teugels, oogkring, vederen aan den wortel der onderkaak tot op de helft der wangen, kin en keel, donker fluweel-zwart; de schachten der vederen van de kin en keel, zuiver wit. Kuif, de achterhelft der wangen en de geheele hals tot op het begin des mantels en tot tegen de borst, donker azuur-blaauw. De overige onderdeelen van den vogel met de vederen der scheenen, de geheele rug, de schoudervederen en de bovenste staart-dekvederen fraai bruin-rood, meer of min in het rosachtig violette spelende. Staartpennen zwartachtig azuur-blaauw, naar achteren in het donker-zwart overgaande: de twee middelste met zeer flauwe, zwarte, smalle dwarsstrepen; de twee paar

buitenste wit aan het uiteinde. Slagpennen der derde orde zwavelachtig azuur-blaauw, de eerste en tweede wit aan de punt. Slagpennen der tweede orde, aan hare voorste helft, donker azuur-blaauw met zwarte dwarsstreepjes; aan de achterste helft zwart en aan de punt wit. Groote slagpennen gekleurd als de slagpennen der tweede orde, maar zonder zwarte dwarsstrepen. Groote boven-dekvederen der vleugelen, glanzig donker azuur-blaauw, met zwarte dwarsstreepjes. Kleine boven-dekvederen en alle onder-dekvederen des vleugels zwartachtig, in het blaauwe spelende. Slag- en staartpennen aan de onderzijde zwart.

Deze soort heeft onder alle bekende soorten de meeste overeenkomst met *Garrulus lanceolatus*, met welke zij door haren krachtigen snavel en de witte schachtvlekken aan de keel overeenstemt; zij is echter grooter, en hare kleuren zijn zoo in het oog vallend, dat men haar noch met voornoemde soort, noch met eenige andere verwarren kan.

Deze fraaije soort is slechts door een eenig voorwerp bekend, hetwelk door den voormaligen Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Indië, Baron VAN DE CAPELLE, naar Europa gebragt werd. Het is tegenwoordig in het bezit van den Hoogleraar LIDTH DE JEUDE te Utrecht, die het ons welwillend ter beschrijving en afbeelding heeft willen toezenden. Prins CH. L. BONAPARTE heeft aan de soort, waartoe dit voorwerp behoort, tijdens zijn bezoek te Utrecht 1 Mei 1850, den naam van onzen Hoogleraar gegeven, en haar voorloopig in eenen brief aan de *Zoological Society* te Londen bekend gemaakt.

Naauwkeurige opgave omtrent de woonplaats dezer soort ontbreken ons te eenenmale. Het schijnt intusschen, dat zij niet op de Indische eilanden gevonden wordt. Waarschijnlijker is het, dat zij in het oostelijke gedeelte van het vasteland van Indië te huis behoort.

GARRULUS LIDTHIL